



แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากของมีคมหรือสิ่งคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน



เข็ม/ของมีคมเป็นอันเลือดตำ



เลือด/สารคัดหลั่งของผู้ป่วยเข้าตา



เลือด/สารคัดหลั่งของผู้ป่วยเข้าปาก



ล้างด้วยน้ำสะอาด/สบู่ (ห้ามบีบคั้น
แผล) ทาด้วย 70% alcohol หรือ
betadine solution หรือ 2%
CHG in 70% alcohol



ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากหรือ
น้ำเกลือ (0.9%NSS)



บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

แจ้งหัวหน้าเวร/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน

ในเวลาราชการ

ติดต่อพยาบาล IC
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
โทร. 1261, 2171, 0184

ใบเจาะเลือด	
ขอที่ counter พยาบาล (ER, IC)	

รายงานอุบัติเหตุ

ขอที่ counter พยาบาล

นอกเวลาราชการ

1. ติดต่อพยาบาลห้องฉุกเฉิน (ER)
2. พยาบาล ER ประสานงานให้ตรวจกับ Chief MED
3. แจ้งงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในวันต่อมา(ในวันและเวลาราชการ)

ซักประวัติบันทึกเป็นหลักฐาน

บุคลากร

1. ตรวจเลือดทันทีหรือหลังเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
2. ส่งตรวจ Anti HIV, Anti HCV*
3. ปรีกษาแพทย์ ID กรณีต้องกินยา anti-viral
4. พยาบาล IC ประเมินความเสี่ยง ให้ความรู้เรื่องโรค การปฏิบัติตัว และ การมาตรวจเลือดตามนัด

ผู้ป่วย

1. ขอส่งเลือดผู้ป่วยตรวจ Anti HCV**, Anti HIV*** ทันทีหรือเร็วที่สุด โดยแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและให้คำปรึกษาก่อน
2. ส่งเลือดตรวจ HBsAg ถ้ายังไม่ทราบผล Anti HBs ของบุคลากร

หมายเหตุ: ถ้าบุคลากรมี Anti HBs positive ไม่ต้องตรวจซ้ำ ถ้าบุคลากรไม่มีภูมิ เจาะเลือดส่งตรวจ HBsAg, Anti HBs, Anti HbC

* ส่งตรวจในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยง เช่น เคยได้รับเลือด ปลุกถ่ายอวัยวะ ฟอกเลือด มีประวัติ Anti HCV positive;

** ส่งตรวจในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยง เช่น เคยได้รับเลือด ปลุกถ่ายอวัยวะ ฟอกเลือด; *** ส่งตรวจใหม่กรณีผู้ป่วยมีผล Anti HIV เกิน 1 สัปดาห์

การส่งเลือดตรวจ ใช้ใบ lab Immunology สีเขียวแบบเก่า เท่านั้น ทั้งในบุคลากรและผู้ป่วย