

CAUTI BUNDLE

Avoid unnecessary urinary catheters

ข้อบ่งชี้ของการใส่สายสวนปัสสาวะดังนี้

1. มีการอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะ
2. ต้องการตัวเลขที่ถูกต้องของจำนวนปัสสาวะ
3. การผ่าตัด :
 - ระยะเวลาสั้น
 - ความถูกต้องของ I/O
 - ผ่าตัดบริเวณก้นกบ
 - ผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ
4. มีแผลบริเวณก้นกบและอวัยวะสืบพันธุ์
5. จำกัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน
6. ความสุขสบายของผู้ป่วยระยะสุดท้าย



Insert urinary catheters using aseptic technique

การใส่สายสวนปัสสาวะ

1. บุคลากรต้องผ่านการฝึกอบรม
2. ล้างมือก่อนใส่สายสวน
3. ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ
4. อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
5. เลือกใช้สายสวนที่เหมาะสม
6. ยึดตรึงสายสวนให้แน่นกับตัวผู้ป่วยบริเวณต้นขา ปุ่มกระดุกเชิงกรานหรือหัวเหน่า

Maintain urinary catheters based on recommended guidelines

การดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ

1. เป็นระบบปิดตลอดเวลา
2. ยึดตรึงไม่ให้หลุดและไม่ขยับไปทางทวารหนัก
3. สายไม่หัก พับ งอหรืออุดตัน
4. ถุงรองรับปัสสาวะอยู่ต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะตลอดเวลา
5. ถุงรองรับปัสสาวะห้ามสัมผัสพื้น
6. แยกภาชนะรองรับปัสสาวะในผู้ป่วยแต่ละราย
7. เทปัสสาวะไม่ให้รู้เปิดของถุงสัมผัสภาชนะรองรับ
8. ล้างมือ สวมถุงมือ เช็ดรูเปิดของถุงปัสสาวะ ด้วย 70% alcohol ก่อนและ หลังเทปัสสาวะ

Review urinary catheter necessity daily and remove promptly

ถอดสายสวนปัสสาวะกรณีต่อไปนี้

1. ไม่มีข้อบ่งชี้
2. ไม่มีความจำเป็นต้องบันทึกจำนวนปัสสาวะอย่างละเอียด

