

วิธีทำงานเรื่อง : การทำความสะอาดห้องผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยหาย หรือจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล	รหัสเอกสาร W-RA-023 วันเริ่มใช้ 4 ตุลาคม 2560	ฉบับที่ A แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1/3
ผู้จัดทำ นางสาววนิดา มัณฑิตา กานดา ฝึกงาน ตำแหน่ง พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ผู้จัดทำ พศ.ศรีลักษณ์ อภิวัฒน์ ธรรมดะ ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้จัดทำ นางสาวสุนทรีย์ ศรีไชти วีระ ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	ผู้ทบทวน <i>นาย C</i> (พศ.นพ.กำธร มาลาธรรม) ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ <i>นาย M. M.</i> (ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ตำแหน่งคณบดี

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

วิธีทำงาน สำหรับห้องผู้ป่วยทั่วไป

- ล้างมือด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์
- สวมผ้าปิดปากและมือ และถุงมือสะอาด
- เตรียมผ้าอย่างน้อย 7 ผืน เท่านี้หากำหนดใช้ในผ้าให้ชุ่มน้ำ
- การทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ตามลำดับดังนี้
 - ผ้าผืนที่ 1 เช็ดโต๊ะครัวเตียง จากด้านบนลงล่าง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผืนที่ 2 เช็ดตู้ข้างเตียงจากบนลงล่าง รวมทั้งลิ้นชัก แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผืนที่ 3 เช็ดเสาน้ำเกลือ infusion pump เก้าอี้ข้างเตียง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผืนที่ 4 เช็ดหัวเตียง และอุปกรณ์ที่อยู่หัวเตียง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผืนที่ 5 เช็ดราวข้างเตียง 2 ข้าง ปลายเตียง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผืนที่ 6 เช็ดหมอนและที่นอน 2 ด้านแล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผืนที่ 7 เช็ดเตียง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ถุงมือ ล้างมือด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์
- กรณีผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัส เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อด้วยเชื้อราที่เฝ้าระวังพิเศษ (C1) ผู้ป่วยติดเชื้อ Clostridium difficile ให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เสื้อกาวน์ ผ้าปิดปากจนมูก และถุงมือ ทำความสะอาดตาม ข้อ 4 และให้เช็ดอย่างน้อย 2 รอบ (เตรียมผ้า 14 ผืน)
- กรณีห้องแยก ให้ปฏิบัติตามนี้
 - ล้างมือด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 - สวมอุปกรณ์ป้องกันตามการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย
 - ผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายเชื้อทางละอองของน้ำมูกน้ำลายในอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 5 ไมครอน (Airborne transmission) ล้างเป็นห้อง negative pressure ให้เปิดระบบทิ้งไว้ 30 นาที สวมผ้าปิดปากจนมูกชนิดธรรมดา และถุงมือ แต่ถ้ารีบด่วนต้องใช้ห้องเปิดระบบทิ้งไว้ สวมผ้าปิดปากจนมูกชนิด N95 และถุงมือ

วิธีทำงานเรื่อง : การทำความสะอาดห้องผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยขยับหรือจำหน่าขอกจากโรงพยาบาล

- 6.2.2 ผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายเชื้อทางละอองของน้ำมูกน้ำลายในอากาศ ที่มีอนุภาคใหญ่กว่า 5 ไมครอน (Droplet transmission) รวมผ้าปิดปากและถุงมือ
- 6.2.3 ผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัส (Contact transmission) รวมเดื่อกวน และถุงมือ
- 6.3 เตรียมผ้าอย่างน้อย 1 ผืนต่อการทำความสะอาด 1 รอบ เท่านี้ยาทำลายเชื้อตามที่โรงพยาบาลกำหนดใส่ในผ้าให้ชุ่มก่อนทำความสะอาดทุกรอบ
- 6.4 เก็บขยะในห้องทิ้ง
- 6.5 ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในห้อง ตั้งแต่ฝาผนัง หน้าต่าง ประตู ลูกบิดประตู อุปกรณ์ในห้องทั้งหมด
- 6.6 ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบเตียงและเตียงผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 4.1-4.7
- 6.7 ทำความสะอาดอ่างล้างมือให้ล้างด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาตามที่โรงพยาบาลกำหนด
- 6.8 กำจัดผุ่นและขยะ ให้ใช้ไม้ดันผุ่น ถูพื้นด้วยน้ำยาทำลายเชื้อตามที่โรงพยาบาลกำหนด
- 6.9 ทำความสะอาดห้องน้ำ ให้ทำความสะอาดห้องน้ำยาทำลายเชื้อตามที่โรงพยาบาลกำหนด
- 6.10 กรณีผู้ป่วยติดเชื้อคือยาที่เฝ้าระวังพิเศษ (C1) และ *Clostridium difficile* ให้ทำความสะอาด 2 รอบเรียบร้อยแล้วให้อบห้องด้วยไนโตรเจนเปอร์ออกไซด์กรานีที่มีความพร้อมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- 6.10.1 ในเวลาราชการ โตรัสพท์แจ้งงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ หมายเลขอ 1261, 2171, 0184
- 6.10.2 นอกเวลาราชการ โตรัสพท์แจ้งงานอุปกรณ์การแพทย์ หมายเลขอ 2255

ห้องผู้ป่วยพิเศษ

- ล้างมือด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอลล์
- สวมผ้าปิดปากและถุงมือ กรณีผู้ป่วยติดเชื้อการสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับห้องผู้ป่วยทั่วไปห้องแยกข้อ 6.2
- เตรียมผ้าอย่างน้อย 1 ผืนต่อการทำความสะอาด 1 รอบ เท่านี้ยาทำลายเชื้อตามที่โรงพยาบาลกำหนดใส่ในผ้าให้ชุ่ม
- จัดเก็บขยะภายในห้อง
- ทำความสะอาดผนังห้อง ประตู ลูกบิดประตู หน้าต่าง
- ทำความสะอาดตู้เสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ ด้วยผ้าชุบน้ำยาทำลายเชื้อตามที่โรงพยาบาลกำหนด
- ทำความสะอาดโซฟาและโต๊ะหน้าโซฟา
- ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่รอบเตียงผู้ป่วยดังนี้
 - ผ้าผึ้นที่ 1 เช็ดโต๊ะครัวเมียง จากด้านบนลงล่าง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผึ้นที่ 2 เช็ดโทรศัพท์และตู้ข้างเตียงจากบนลงล่าง รวมทั้งลิ้นชัก แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผึ้นที่ 3 เช็ดเสาน้ำเกลือ แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผึ้นที่ 4 เช็คหัวเตียง และโคมไฟ แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผึ้นที่ 5 เช็คราข้างเตียง 2 ข้าง ปลายเตียง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผึ้นที่ 6 เช็คหมอนและที่นอน 2 ด้านแล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - ผ้าผึ้นที่ 7 เช็ดเตียง แล้วทิ้งในถุงที่กำหนด
 - เมื่อทำความสะอาดเสร็จถอดถุงมือ และล้างมือให้สะอาด
- กรณีผู้ป่วยติดเชื้อทำความสะอาดข้อ ข้อ 8.1-8.7 จำนวน 2 รอบ

วิธีทำงานเรื่อง : การทำความสะอาดห้องผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยขยับหรือจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

9. กำจัดผุนและขยะด้วยไม้ดันผุน ตามด้วยถุงพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดเชือตามที่โรงพยาบาลกำหนด
10. ทำความสะอาดอ่างล้างมือโดยให้ล้างด้วยตัวยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดเชือตามที่โรงพยาบาลกำหนด
11. ทำความสะอาดห้องน้ำให้ทำความสะอาดเชือตามที่โรงพยาบาลกำหนด
12. ถอดอุปกรณ์ป้องกันและล้างมือ
13. กรณีผู้ป่วยติดเชื้อด้วยที่เฝ้าระวังพิเศษ (C1) และ *Clostridium difficile* ให้ทำความสะอาด 2 รอบเรียบร้อยแล้วให้อบห้องด้วยไสโคโรเจนเปอร์ออกไซด์ เช่นเดียวกับห้องแยกในห้องผู้ป่วยทั่วไป

อชุตานัน พุ่มคง

วันที่เริ่มใช้ 4 ตุลาคม 2560 หน้า 3/3