

เคลื่อนย้าย-นำส่งทารกปลอดภัย

นางสาวกันยา กุลสุข ห้องคลอด งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชฯ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี

ปัญหา/สภาพปัญหาก่อนปรับปรุง (Plan)

ห้องคลอดโรงพยาบาลรามาธิบดีให้การดูแลทารกแรกเกิดเฉลี่ยปีละ 1,500 -2,000 ราย ภายหลังกคลอดทารกแรกเกิดส่งเกิดอาการในห้องคลอดจนครบ 6 ชั่วโมงจำทำการย้ายทารกไปอยู่กับมารดาที่แผนกสูติกรรมชั้น 6 และสูติกรรมพิเศษชั้น 4 ก่อนหน้านี้นี้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดจะเป็นผู้เคลื่อนย้ายเด็กโดยวิธีการห่อตัวและอุ้มทารกไปส่งยังห้องทารกแรกเกิดของแผนกมารดาหลังคลอดสูติกรรม

ปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่อุ้มทารกเดินไปส่งยังห้องทารกแรกเกิด อาจทำให้มีโอกาเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม เกิดอุบัติเหตุ เกิดอันตรายต่อทารกขณะเคลื่อนย้าย และมีโอกาสติดเชื้อจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมภายนอก และการเคลื่อนย้ายทารกยังไม่เป็นมาตรฐาน

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายทารกจากการอุ้มและเพื่อให้มีแนวทางการเคลื่อนย้ายทารกอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1.อัตราการวัดด้วยยาวของทารกแรกเกิดของเจ้าหน้าที่ถูกต้องครบถ้วน	95 %
2. อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดด้วยยาวทารกแบบใหม่	100%

ผลที่ได้จากการปรับปรุง

ผลดำเนินการ (1 ปี)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปรับปรุงครั้งที่ 1 (6 เดือน)	ปรับปรุงครั้งที่ 2 (6 เดือน)	ปรับปรุงครั้งที่ 3 (6 เดือน)
1.อัตราการเกิดพลัดตกหกล้มของทารกแรกเกิดจากการย้ายทารก	0 %	0 %	0 %	0 %
2.อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการเคลื่อนย้ายทารกที่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ห้องคลอด	100 %	80 %	90 %	100 %

การจัดทำมาตรฐาน

- ☒ มีการจัดทำมาตรฐานการทำงาน(VI) เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดในห้องคลอด โดยมีผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลห้องทารกแรกเกิดเป็นผู้ดูแล

การดำเนินการขยายผลหลังเสร็จสิ้นโครง

- ☒ ใช้ในหน่วยงานห้องคลอด
- ☒ และขยายผลไปยังหอผู้ป่วย 6SW

ก่อนปรับปรุง




เคลื่อนย้ายโดยการห่อตัวและอุ้มทารกเดินไป

สภาพหลังปรับปรุงครั้งที่1



นำ crib มาใช้ในการเคลื่อนย้ายทารกแทนการอุ้ม

สภาพหลังปรับปรุงครั้งที่ 2-3



นำ crib มาคลุมด้วยพลาสติกใสเพิ่มเติม



ใช้ Crib ที่มีผ้าตาข่ายคลุมได้หมดทั้ง Crib นำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายทารก



กระบวนการปรับปรุง

- ขั้นตอนการวางแผน(Plan) :** นำเสนอปัญหาเข้าที่ประชุมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) :** พัฒนาวิธีการเคลื่อนย้าย เพื่อนำมาทดลองใช้ในการเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดและเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตามเอกสารแนบ)
- ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check):** การปรับปรุงครั้งที่ 1 ติดตามผลการใช้งานทุก 1 เดือนเป็นเวลา 6 เดือน พบว่าไม่มีทารกเกิดการพลัดตกหกล้ม แต่พบวาระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังห้องทารกแรกเกิด ต้องใช้ลิฟท์ทำให้มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมภายนอก

การปรับปรุงครั้งที่ 2 (ใช้พลาสติก) ติดตามผลการใช้งานทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าพลาสติกไม่สามารถปกคลุมได้ทั้ง crib และไม่สวยงาม

การปรับปรุงครั้งที่ 3 (ใช้ผ้าตาข่ายคลุม) ติดตามผลการใช้งานทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน
- จัดทำมาตรฐาน (Act) :** ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทำงาน และการนำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายทารกแรกเกิดในห้องคลอด เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน