



ข้อมูลผู้เจ็บป่วยที่มีประวัติสัมผัสกัญชา และปรึกษามายังศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี (เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2565)

นับจากการปลดล็อกกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีกรณีผู้ป่วยจากการได้รับกัญชา และปรึกษามายังศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเพิ่มขึ้นโดยในช่วงระยะเวลา มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีจำนวนผู้ป่วยจากการสัมผัสกัญชาทั้งสิ้น 212 คน โดยมีการปรึกษามาในช่วงเดือนต่างๆดังนี้

- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 68 คน (ข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 และ มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีจำนวนผู้ป่วย 21 คน และ 15 คน ตามลำดับ)
- เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 75 คน (ข้อมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และ กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนผู้ป่วย 26 คน และ 20 คน ตามลำดับ)
- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 69 คน (ข้อมูลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และ สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนผู้ป่วย 20 คน และ 27 คน ตามลำดับ)

ในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับกัญชาเพียงสารเดี่ยว 161 คน (ร้อยละ 75.9) มีผู้ป่วยได้รับสารอื่นร่วมจำนวน 51 คน (ร้อยละ 24.1) สารที่พบร่วมด้วยบ่อยได้แก่ กระเทียม 19 คน สุรา 13 คน และ สารในกลุ่มแอมเฟตามีน 8 คน ผู้ป่วยร้อยละ 35.4 (75 คน) เป็นผู้ไม่เคยใช้หรือได้รับกัญชามาก่อน

การได้รับกัญชาของผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีวิธีการต่างๆดังนี้

- ร้อยละ 53.3 (113 คน) ได้รับโดยการสูบ
- ร้อยละ 46.7 (99 คน) ได้รับโดยการกิน ซึ่งมีรูปแบบต่างๆดังนี้คือ น้ำมันกัญชา 18 คน อาหารควาไส้กัญชา 25 คน เครื่องดื่มไส้กัญชา 22 คน บราวนี่กัญชา 15 คน ลูกกัญชา 14 คน และรูปแบบอื่นๆ 5 คน

วัตถุประสงค์การใช้หรือได้รับกัญชาได้แก่

- ร้อยละ 41.0 (87 คน) จงใจเสพเพื่อนันทนาการ
- ร้อยละ 27.4 (58 คน) อยากทดลองใช้ว่าจะมีผลอย่างไร
- ร้อยละ 7.5 (16 คน) ใช้โดยเชื่อว่าจะบรรเทาอาการ โรค หรือส่งเสริมสุขภาพ
- ร้อยละ 5.2 (11 คน) ไม่มีเจตนาจะได้รับกัญชา
- ร้อยละ 18.9 (40 คน) ไม่ระบุวัตถุประสงค์

อาการและอาการแสดงในระบบอวัยวะที่พบบ่อยได้แก่

- อาการในระบบหัวใจและหลอดเลือด: ใจสั่น 73 คน ตรวจพบหัวใจเต้นเร็ว 96 คน ความดันโลหิตสูง 69 คน เจ็บแน่นหน้าอก 44 คน
- อาการในระบบทางเดินอาหาร: คลื่นไส้ 47 คน อาเจียน 49 คน ปวดท้อง 22 คน
- อาการในระบบประสาท: มึนศีรษะ 49 คน ง่วงซึม 48 คน สับสน 26 คน กระวนกระวาย 28 คน กล้ามเนื้อเกร็ง 16 คน ชัก 15 คน
- อาการอื่นๆ: หอบเหนื่อย 31 คน ปากคอแห้ง 16 คน อ่อนเพลีย 16 คน

ร้อยละ 59.4 ของผู้ป่วย (126 คน) ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (นอนโรงพยาบาลหนึ่งวัน 91 คน สองวัน 17 คน มากกว่าสองวัน 18 คน)

ในจำนวนนี้ได้รับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง 19 คน ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ 7 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน ผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมด 7 คนรวมถึงรายที่เสียชีวิตนั้น มีจำนวน 6 คน เป็นผู้ที่มีการใช้สารอื่นร่วมด้วย หรือมีโรคประจำตัวที่ยาประจำตัวสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยากับสารในกัญชา และก่อให้เกิดอันตรายได้ มีเพียงหนึ่งคนที่สูบกัญชาอย่างเดียวเป็นชายอายุ 14 ปีแล้วมีอาการซึม หมดสติไม่ตอบสนอง แพทย์จึงใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อป้องกันทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน ต่อมาผู้ป่วยตื่นรู้ตัวมากขึ้น จึงเอาท่อช่วยหายใจออกได้

มีร้อยละ 10.8 (23 คน) ของผู้ป่วย ที่แจ้งแหล่งที่เข้ารับกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาได้แก่ ได้จากคนรู้จักเช่น เพื่อนหรือญาติ 16 คน ซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย 3 คน เป็นเจ้าของต้นกัญชาเอง 2 คน ซื้อจากแหล่งอื่นๆ 2 คน

ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากกรณีผู้ป่วย

- มีการใช้กัญชาเพื่อเสพนันทนาการและการใช้อื่นซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการปลดล็อกกัญชาที่ใช้เพื่อการแพทย์
- กลุ่มที่เสพนันทนาการยังมีการเสพร่วมกับสารเสพติดอื่นซึ่งเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้
- มีการกินอาหารและขนมที่ใส่กัญชาแล้วเกิดการบาดเจ็บทั้งที่จงใจทดลองกินและกินโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นอาหารหรือขนมที่ใส่กัญชา
- ปัจจุบันมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ซึ่งจะทำการตรวจยืนยันการวินิจฉัยและจัดแนวทางการรักษาโรคให้เหมาะสม หากมีข้อบ่งชี้สำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ จะทำการตรวจสอบข้อห้าม ข้อควรระวัง รวมถึงภาวะยาตีกัน (ปฏิกิริยาระหว่างยาและสารกัญชา) ก่อนส่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับมาตรฐานของการผลิตยา นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ไม่แน่ใจว่าโรคหรือภาวะของตนควรจะใช้กัญชาหรือไม่ สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ
- ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาเองโดยไม่ปรึกษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะรักษาไม่ตรงสาเหตุหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชา

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาของตนเองและบุคคลรอบตัว ควรใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้องเท่านั้น และไม่สนับสนุนการใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการแพทย์