

การ Feed ยา Duo-Dart

รับคำสั่งให้ละลายยาจากแพทย์ _____

(Dutasteride 0.5mg/Tamsulosin HCl 0.4mg)


เนื่องจากข้อมูลปัจจุบันไม่แนะนำให้แกะหรือละลายยาเพื่อให้ทางสายยางแก่ผู้ป่วย หากยืนยันใช้ต้องยืนยันการรับคำสั่งจากแพทย์ก่อนเท่านั้น

Admin time: _____ Duo-Dart 1 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 1 ครั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้: 1) ภาชนะใส่ยา 2) หลอดดูดยา 3) เข็มฉีดยา 4) ซองซิป์ 5) น้ำดื่มอุณหภูมิห้อง

(ก่อนเตรียมยาผู้ผสมยาควรใส่ถุงมือ)

1. แกะแคปซูลด้านนอกตัวยาออก
2. เทตัวยาด้านในทั้งหมดออกจากแคปซูล ลงในภาชนะรองรับ
3. แยกตัวยาแคปซูลนิ่มสีเหลืองออก เตรียมใส่ไว้ในซองซิป์
4. เทเม็ดยาเล็ก ๆ สีขาวทั้งหมดใส่ ไชริงค์แก้วที่ต่อเข้ากับสายให้อาหาร (โดยให้พับสายอาหารไว้ก่อน)
5. เติมน้ำอุณหภูมิห้อง 10 ซีซี ลงในไชริงค์แก้ว เขย่าไชริงค์เบา ๆ
6. คลายการพับสายอาหาร พร้อมดันยาเข้าทางสายอาหารทันที
7. ดูดน้ำ 5 ซีซี จากน้ำเขย่าเบา ๆ และดันน้ำเข้าทางสายอาหาร
8. ใช้เข็มฉีดยาเจาะยาแคปซูลนิ่มสีเหลือง แล้วบีบไล่ตัวยาออกจากแคปซูล
9. เติมน้ำ 10 ซีซี เขย่าเบา ๆ เพื่อละลายยาในซองซิป์
10. ใช้ไชริงค์ดูดสารละลายทั้งหมดให้ผู้ป่วยทางสายยาง
11. กลั้วตัวยาที่เหลือในซองซิป์ด้วยน้ำอีก 10 ซีซี ให้ทางสายยางอีกครั้ง



References:

1. จตุพร ทองอัม, วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, อุษณีย์ วนธรรมณณ์, ภูษวิญ อรุณมานะกุล, ธนอมพงษ์ เสถียรลีคณา, ประดิษฐ์ งามศิริผล, บรรณาธิการ. คู่มือเภสัชกรครอบครัว. กรุงเทพฯ: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย); 113-36
2. รายการยาห้ามแบ่งบด. (2556) งานเภสัชกรรมคลินิก โรงพยาบาลรามธิบดี
3. Dutasteride and tamsulosin: Drug information. In: Post TW, editor. Uptodate [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2022 [cited 2022 Jan 5]. Available from: www.uptodate.com/contents/dutasteride-and-tamsulosin-drug-information
4. Lansoprazole: Drug information. In: Post TW, editor. Uptodate [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2022 [cited 2022 Jan 5]. Available from: www.uptodate.com/contents/Lansoprazole-drug-information