



One Point Lesson

การบริหารยา Adenosine

SDSIPD2 ขอขอบคุณข้อมูลการบริหารยา Adenosine

พว.อุรศรี อัมสมบุรณ์

ผู้ตรวจการพยาบาล

พว.นลินี นิยมไทย

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษวิกฤตหัวใจ 91


งานการพยาบาลวิกฤต 2



วิธีการบริหารยา Adenosine

- **Adenosine** ขนาดยา 6 มก.IV bolus รอ 1-2 นาทีแล้วไม่ได้ผลก็สามารถให้ครั้งที่ 2 และ 3 ในปริมาณ 12 มก.

Double syringe technique



วิธีการบริหารยา Adenosine

1. เปิด IV ไก่ ๆ หัวใจ เช่น บริเวณข้อพับแขน
2. ติด monitor EKG
3. เตรียมต่อ 3-way ซึ่งใช้ syringe 20 ml ที่ใส่ saline ไว้คอย flush ตามยาที่ฉีดอย่างรวดเร็ว
4. ยกแขนข้างนั้นขึ้นสูง

กรณีที่ได้ยาแล้วไม่ตอบสนองให้ลองทบทวนหาสาเหตุดังนี้

1. วิธีการฉีดไม่ถูกต้อง (ฉีดยาหรือ flush saline ตามไม่เร็วพอ)
2. เปิดเส้นที่แขนส่วนปลาย(ข้อมือ) ทำให้ยาหมดฤทธิ์ก่อน)
3. วินิจฉัย EKG ผิด เช่น rate regular แต่เป็น Sinus tachycardia (ให้หาสาเหตุและแก้ไขต่อไป)
4. rate irregular เช่น Atrial fibrillation with rapid ventricular response (AF with RVR) เป็นต้น



Thanks!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

Please keep this slide for attribution