

แมลงก้นกระดก

พบบ่อยช่วงปลายฤดูฝน บริเวณป่าหรือพงหญ้าที่มีความชื้น
เนื่องจากเป็นที่ที่แมลงก้นกระดกชอบอาศัยอยู่ ซึ่งแมลงก้นกระดก
จะมีความยาวลำตัวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร

อาการเมื่อถูกพิษ

เมื่อสัมผัสกับสาร **Paederin** ที่เป็นกรดจาก
แมลงก้นกระดก จะทำให้เกิดควาระคาย
เคืองกับผิวหนัง มีอาการ คัน แสบร้อน
จนถึงมีผื่นแดง ตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง



ผื่นบริเวณซอกพับ
ที่ประกบกัน



ผื่นแดงขอบชัดเจน
เป็นทางยาว

ผู้จัดทำ

พญ.กัญญาภา ชาญจิรกิตติ
ภาควิชาศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามารับดี
อ่างอิง

เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล. ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis). 21, August. 2560, https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/965_1.pdf



วิธีการรักษา

1. ล้างด้วยน้ำเปล่าและสบู่ หรือน้ำเกลือ
2. หากมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองขึ้น ควรรีบไป
พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและใช้สเตรียรอยด์ในการรักษา

วิธีป้องกัน

- หลีกเลี่ยงการปิดหรือบีบแมลงก้นกระดก
สามารถใช้การเป่าหรือวัตถุอื่นมาปิดทิ้ง
- ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด
- ปิดที่นอน หมอน ผ้าห่มก่อนนอน
- ลดการเปิดไฟตอนกลางคืน เนื่องจาก
แมลงก้นกระดกชอบแสงไฟ

