


วัดไข้และความดันโลหิตที่ชั้น 4 เคาน์เตอร์ B

ก่อนมาห้องส่องกล้องปอด



บัตรนัดส่องกล้องตรวจหลอดลม

(Bronchoscopy)



ศูนย์ส่องกล้อง (ส่องกล้องตรวจหลอดลม)

ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ

โทร 02-200-4458

เวลา 8.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

ใช้แอปพลิเคชัน LINE หรือ QR Code reader ใน
สมาร์ทโฟนเพื่อลิงค์ดูข้อมูลคำแนะนำ และวิธีการ

เตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม



การส่องกล้องตรวจหลอดลม

เป็นการนำกล้องสำหรับตรวจหลอดลมที่มีลักษณะเป็นท่อยาวเล็กๆ ขนาด 0.5 ซม. ยาวประมาณ 60 ซม. ส่วนปลายท่อบีเลนส์ใช้มองภาพได้ สอดเข้าทางจมูก ผ่านคอ ผ่านเข้าไปในหลอดลม เพื่อเป็นการตรวจหาภาวะผิดปกติภายในหลอดลม เก็บเสมหะในหลอดลมเล็ก มาทำการเพาะเชื้อและส่งหาเซลล์มะเร็ง
ในบางรายอาจมีการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆขนาด 1-2มิลลิเมตร เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

ในการส่องกล้องตรวจหลอดลม ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือ สามารถนอนนิ่งได้นานประมาณ 30-45 นาที ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ แต่จะได้รับยาชาพ่นเฉพาะที่ทั้งในจมูก ปาก และคอ เพื่อให้ไม่มีอาการเจ็บปวดและลดการระคายเคืองจากกล้องที่ผ่านลำคอ
ขณะทำการตรวจ ผู้ป่วยทั่วไปมักจะรู้สึกเจ็บแต่อาจมีอาการไอบ้าง ในบางรายที่มีโรคปอดเรื้อรังอยู่แล้ว อาจมีอาการเหนื่อย

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ

1. งดอาหารและน้ำดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
2. ยาประจำที่รับประทานอยู่ให้รับประทานตามปกติ
โดยดื่มน้ำแต่น้อย ประมาณ 30 ซีซี

การปฏิบัติตัวในวันตรวจ

1. ให้มายื่นบัตรนัดที่ศูนย์ส่องกล้องอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ชั้น 5 (แผนกส่องกล้องปอด) ก่อน
เวลานัดอย่างน้อย 30 นาที
2. ของมีค่า แว่นตา หรือ ฟันปลอม ต้องถอดออกก่อน
เข้าห้องทำหัตถการ และฝากไว้กับญาติ
3. หากมีโรคประจำตัว แพ้ยา มีประวัติเลือดออกง่าย ให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ

การปฏิบัติตัวหลังส่องกล้อง

1. หลังส่องกล้องเสร็จจะยังมีอาการชาในลำคอ ให้ดื่มน้ำและอาหารต่ออีก 2 ชม.แล้วจึงเริ่มจิบน้ำถ้าไม่สำลัก ให้รับประทานอาหารได้ตามปกติ
2. ถ้ามียาที่รับประทานอยู่ให้รับประทานยาได้ตามปกติ
3. อาจมีไข้หลังส่องกล้อง 24 ชม. รับประทานยาลดไข้ได้ตามปกติ
4. อาจมีอาการเจ็บคอ เสียงแหบหลังส่องกล้อง 1-2 วัน
5. ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ให้มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 - ไอเป็นเลือดสดจำนวนมาก
 - มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรือ เหนื่อยมากขึ้น
 - มีไข้สูงนานเกิน 24 ชั่วโมง
6. มาตรวจตามนัดเพื่อฟังผลหลังส่องกล้อง

ภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้อง ที่อาจเกิดขึ้นได้

1. เกิดการสำลักอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารทำให้เกิดปอดอักเสบ
2. มีอาการบวมบริเวณสายเสียด
3. มีภาวะพร่องออกซิเจนและอาจเกิดระบบหายใจล้มเหลว
4. มีภาวะหลอดลมตีบ
5. มีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอด
6. มีเลือดออกในหลอดลม
7. ปอดอักเสบติดเชื้อ
8. แพ้ยาชาหรือยาที่ใช้ในระหว่างทำหัตถการ
9. อาจทำหัตถการได้ไม่สำเร็จ
10. อาจไม่พบรอยโรคหรือให้การวินิจฉัยได้จากการส่องกล้องทางเดินหายใจ

แต่โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนพบได้น้อยประมาณ 8 %

บัตรนัดส่งกล้องตรวจหลอดลม Premium

ชื่อ.....

HN.....

นัดวันที่ เวลา.....

- งดน้ำและอาหารทุกชนิด

ตรวจ ATK แบบแยงจมูก

วันที่

☐ หลังเที่ยงคืน ☐ หลัง 6 โมงเช้า

- ถ้ามีขาดความดันโลหิตสูงให้ทานยาเวลา 6 โมงเช้า

ของวันตรวจดื่มน้ำตามยาเล็กน้อย

- งดยาละลายลิ่มเลือดหรือแอสไพรินตามคำสั่งแพทย์

ตั้งแต่วันที่

- งดยาเบาหวานเข้าวันที่มาส่งกล้อง

- มีญาติมาด้วย 1 คน

- นำกระดาษทิชชู มา 1 ม้วน

- ค่าส่งกล้องประมาณ 25,000 บาท

- ค่าหัตถการพิเศษประมาณ 50,000 บาท

- ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ให้แจ้งก่อนเข้าทำหัตถการ

- กรณีใช้สิทธิประกันสุขภาพหรือประกันสังคมต้อง

ติดต่อรับรองสิทธิที่แผนกผู้ป่วยสัมพันธ์ก่อน