





UPDATE TRACER : | **2020**
POST PARTUM HEMORRHAGE

แนวทางการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด




- ปรับปรุงและแก้ไขแนวทางในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
- เพิ่มเติมการประเมินการเสียเลือด เพื่อเป็นการเตือนให้แพทย์ผู้ทำคลอดทราบว่าสตรีตั้งครรภ์เสียเลือดไปเท่าไร

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลลัพธ์ (ร้อยละ)	การวิเคราะห์ผลลัพธ์
ประเมินความเสี่ยงของภาวะมดลูกหดตัวไม่ดีหลังคลอด ในสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดทางช่องคลอด			
สตรีตั้งครรภ์ที่เข้าสู่ระยะคลอดที่วางแผนคลอดทางช่องคลอดได้รับการประเมินความเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกหดตัวไม่ดี	100	100	- พยาบาลเตรียมเอกสารการประเมินความเสี่ยงการตกเลือดให้แพทย์ประเมินทุกราย - แพทย์ประจำบ้านทุกคนทราบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่เข้าสู่ระยะคลอดที่วางแผนคลอดทางช่องคลอดต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอดทุกราย - มีการส่งเสริมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร - บุคลากรใหม่ทั้งแพทย์และพยาบาล จะได้รับการแนะนำถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการตกเลือดหลังคลอด
อัตราการใช้ถุงตรวจเลือดในสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดทางช่องคลอด	100	100	บุคลากรใหม่ทั้งแพทย์และพยาบาล ได้รับการแนะนำการใช้ถุงตรวจเลือดและมีการประเมินการใช้ถุงตรวจเลือดอย่างถูกต้อง

*ผลลัพธ์ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลลัพธ์ (ร้อยละ)	การวิเคราะห์ผลลัพธ์
ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันภาวะมดลูกหดตัวไม่ดีหลังคลอด ในสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดทางช่องคลอด			
■ สตรีตั้งครรภ์ได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกทุกราย ถ้าไม่มีข้อห้ามการให้ยา	100	100	
■ สตรีตั้งครรภ์ที่คลอดทางช่องคลอดทุกราย ต้องได้รับการทำ Active management of 3rd stage of labor	100	NA	■ การทำคลอดรกด้วยวิธี control cord traction ยังไม่สามารถทำได้ในกรณีที่นักศึกษาแพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์เป็นผู้ทำคลอด


*ผลลัพธ์ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563



อัตราการตกเลือดหลังคลอด


จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ปี 2020

จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด (ราย)




	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
Postpartum hemorrhage (PPH)	10	5	4	5	4	1	2	4	3	2	6	0
Postpartum hemorrhage (PPH) Normal delivery	4	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
Postpartum hemorrhage (PPH) Cesarean section	6	3	4	5	3	1	2	3	2	2	5	0

อัตราการตกเลือดหลังคลอดปี 2020 (PPH rate)




สาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด





การประเมินความเสี่ยงของการตกเลือดหลังคลอดจากภาวะมดลูกหดรัดตัวไม่ดี

MEDIUM RISK		HIGH RISK
☐ Previous uterine scar	☐ > 4 previous deliveries	☐ Hematocrit < 30
☐ Multiple gestation	☐ Large fibroids (≥ 5 cm)	☐ Coagulation defect/ thrombocytopenia
☐ <u>Tocolytic use</u>	☐ <u>Chorioamnionitis</u>	☐ History of PPH
☐ Prolong use oxytocin (≥ 4 Hr)		



อัตราการตกเลือดหลังคลอด 3 ปี ย้อนหลัง





THANK YOU