



Purpose/ Aim

1) 80% ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

ประเมินที่ 3 เดือน

- จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน

Inattention หรือ ในส่วน Hyperactivity/Impulsive ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ใน 9 ข้อ

- แต่ถ้าเริ่มแรก จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน Inattention หรือ ในส่วน

Hyperactivity/Impulsive น้อยกว่า 6 ใน 9 ข้อ

จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน

Inattention หรือ ในส่วน Hyperactivity/Impulsive ต้องลดลงอย่างน้อย 1 ข้อ

ประเมินที่ 1 ปี

- จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน

Inattention หรือ ในส่วน Hyperactivity/Impulsive ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ใน 9 ข้อ

2) 95% ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยา

ADHD

Primary Drivers

วินิจฉัยถูกต้อง

การรักษาที่เหมาะสม

ติดตามอาการหลังการรักษา

ป้องกันและติดตามผลข้างเคียง

Secondary Drivers

ตาม DSM - 5 criteria

รักษาแบบใช้ยา

รักษาแบบไม่ใช้ยา

ประเมินผลการรักษาที่ 3 เดือน

ประเมินผลการรักษาที่ 1 ปี

ประเมินก่อนการรักษา

ติดตามระหว่างการรักษา

Change Ideas/ Actions

ซักประวัติตาม DSM - 5 criteria

ประเมินโรคที่อาจเกิดร่วมได้

ตามเกณฑ์และข้อบ่งใช้ในการให้ยา

ประเมินเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม

จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน Inattention หรือในส่วน Hyperactive/Impulsive ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ใน 9 ข้อ

แต่ถ้าเริ่มแรก จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน Inattention หรือในส่วน Hyperactive/Impulsive น้อยกว่า 6 ใน 9 ข้อ จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน Inattention หรือในส่วน Hyperactive/Impulsive ต้องลดลงอย่างน้อย 1 ข้อ

จำนวนข้อที่ให้คะแนน 2 หรือ 3 ในส่วน Inattention หรือในส่วน Hyperactive/Impulsive ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ใน 9 ข้อ

ประเมิน Cardiovascular risk ก่อนเริ่มยา

ติดตาม น้ำหนัก ส่วนสูง และความดันโลหิต

Ongoing process for data collection