



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ริดสีดวงหนักๆ รักษาอย่างไร?

ริดสีดวงทวารมี 2 แบบ

ริดสีดวงทวาร แบบภายนอก

มีก้อนอยู่ด้านนอกทวารหนักตลอดเวลา จะไม่มีอาการใด ๆ
และไม่ได้มีการแบ่งระยะของอาการ แต่อาจมีการอักเสบได้
หากบ่งหนัก ๆ ก้อนจะโตขึ้นและปวดมาก


การรักษาริดสีดวงทวารแบบภายนอก

รักษาแบบประคับประคองด้วยยา

ริดสีดวงทวารแบบภายใน

แบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะที่
1



มีเลือดออก
แต่ไม่มีก้อนออกจากทวารหนัก

ระยะที่
2



มีก้อนออกจากทวารหนักเมื่อขับถ่าย
และก้อนกลับเข้าไปได้เอง
หลังขับถ่ายเสร็จ อาจมีเลือดปน

ระยะที่
3



มีก้อนออกจากทวารหนัก
เมื่อขับถ่ายต้องใช้มือดันกลับเข้าไป
และบางครั้งจะมีอาการปวดร่วมด้วย
อาจมีเลือดปน

ระยะที่
4



มีก้อนออกมาตลอดเวลา
หลังขับถ่ายมีอาการปวดมาก
และอาจต้องผ่าตัดดุกูเงิน

การรักษาริดสีดวงทวารแบบภายใน มี 3 วิธี



กินยาหรือเหน็บยา
สำหรับรักษาในระยะเริ่มต้น



ฉีดยาหรือรัดหัวริดสีดวงให้ฝ่อ
สำหรับรักษาในระยะที่ 2-3



ผ่าตัด สำหรับรักษา
ในระยะที่ 3-4

หากสงสัยว่าเป็นริดสีดวงให้รีบมาพบแพทย์เพราะจะช่วยให้ทำการรักษาได้ง่ายกว่า
หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้เสียเลือดจนถึงขั้นต้องให้เลือดได้



LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

พศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงห์ทัศน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>