

# ฝีดาษขวาน VS โควิด-19

## เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

โรคฝีดาษขวานและโควิด-19 มีความแตกต่างกันพอสมควร การทราบถึงความแตกต่าง จะทำให้รู้จักการป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกตื่นกลัวจนเกินไป

### ฝีดาษขวาน

### โควิด-19

เชื้อก่อโรค

เชื้อไวรัสชนิดดีเอ็นเอ

เชื้อไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอ

ชนิดของโรค

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

การติดต่อจากคนสู่คน

สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ รอยโรคหรือพื้นที่ผิวหนังหรือวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเข้าทางผิวหนังที่มีแผล เยื่อบุตา จมูก หรือสูดดม

ไอ จามรดกัน สัมผัสสารคัดหลั่ง จากทางเดินหายใจหรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเข้าทางเยื่อบุตา จมูก ปากหรือหายใจ

ระยะฟักตัวเฉลี่ย

6-13 วัน

2-4 วัน

อาการ

มี 2 ระยะคือ  
• ระยะก่อนออกผื่น เช่น มีไข้ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย  
• ระยะออกผื่น จะมีผื่นแบน บูน ตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง และตกสะเก็ดตามลำดับ

• อาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ และหอบเหนื่อย  
• อาการอื่น ๆ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย และท้องเสีย

ความยากง่ายของการติดเชื้อ

ยากกว่า ต้องอยู่ใกล้ชิดกันมากและนาน ผู้ป่วยแพร่เชื้อได้เมื่ออยู่ในระยะออกผื่น

ง่ายกว่า ผู้ป่วยแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ก่อนมีอาการ 1-2 วันจน 3-4 วันหลังมีอาการ

การวินิจฉัยยืนยัน

ส่งน้ำหรือหนองจากรอยโรคหรือ ผื่นตรวจวิธี PCR

ส่งสารคัดหลั่งที่จมูกหรือคอตรวจวิธี PCR

ชุดตรวจด้วยตัวเอง (ATK)

ยังไม่มี

มี

การป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

ไม่สัมผัสสัตว์ป่าโดยไม่ป้องกัน โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือตาย ไม่สัมผัสเนื้อสัตว์ เลือด และชิ้นส่วนอื่น กินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก

ยังไม่มีคำแนะนำชัดเจน

การป้องกันการติดเชื้อจากคนสู่คน

หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงรับเชื้อ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อย ๆ

แนะนำให้งดการมีเพศสัมพันธ์

ใช่

ไม่ใช่

วัคซีนป้องกัน

มีจำกัด

มีหลายชนิด

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน

เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการไวรัส

ทุกคน ตามอายุที่วัคซีนรับรอง

ยาต้านไวรัส

มีรับรอง 1 ชนิด ยังไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลาย

มีหลายชนิด ใช้ตามข้อบ่งชี้