



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝีดาษขวาน

ป้องกันอย่างไร รักษาหายไหม?



คนไข้ฝีดาษขวานส่วนใหญ่มักมีอาการน้อยและหายได้เอง

บางรายที่มีอาการมากขึ้นหรือมีโรคประจำตัว
อาจต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้น

ช่วงแพร่เชื้อ

ช่วงสัปดาห์แรกตอนที่ มีผื่น
ควรแยกตัวเองจนกว่าแผลจะแห้งตกสะเก็ด
และการตรวจ PCR เป็นลบ
**คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ
ควรแยกตัวสังเกตอาการ 21 วัน**

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส

มียาหลายชนิดที่ใช้รักษาไข้ทรพิษ (smallpox)
และคาดว่าจะสามารถรักษาฝีดาษขวานได้
เช่น ยาเทโควีริแมต (tecovirimat)
ยาบรินซิโดโฟเวียร์ (brincidofovir)
ยาซิโดโฟเวียร์ (cidofovir) เป็นต้น

หากรักษาได้ดีจะมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมาก ในแอฟริกามีการเสียชีวิต
ราวร้อยละ 6-11 แต่ในช่วงที่มีการระบาดในสหรัฐอเมริกา
ไม่พบผู้เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับประชากร ระบบสาธารณสุข
และสายพันธุ์ด้วยว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด

การป้องกัน



วัคซีน (ก่อนหรือหลังสัมผัส)

ข้อมูลชี้ว่าหากเคยปลูกฝีไข้ทรพิษ
(ฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ) จะสามารถป้องกันไม่ให้ติด
หากได้รับเชื้อ อาการก็จะไม่รุนแรง
การได้รับวัคซีนหลังจากสัมผัส
เชื้อโรคฝีดาษขวานแล้ว บางรายสามารถช่วยได้
การเสียชีวิตต่ำ ความรุนแรงต่ำ



ทำความสะอาดเสื้อผ้า และที่นอนบ่อย ๆ

หากใช้ร่วมกันกับผู้อื่น



ป้องกันตนเอง

ด้านการสัมผัส
ละอองผ่านการหายใจ
สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อย ๆ



งดสัมผัสสัตว์ป่วย



ไม่สัมผัสสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วย

รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่มีการป้องกัน

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>



ฉลาดซอาน
ป้องกันอย่างไร
รักษาหายไหม?