



วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อรุนแรงและการเสียชีวิต

โรคไข้หวัดใหญ่

- อาจทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ
- หากรุนแรง อาจเสียชีวิตได้



ฉีดวัคซีน 1 เข็ม ทุกปี

โรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส

- ทำให้เกิดปอดอักเสบ
- อาจติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
- หากรุนแรง อาจเสียชีวิตได้



ฉีดวัคซีนชนิด 13 หรือ 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี

โควิด-19

- ทำให้เกิดปอดอักเสบ
- หากรุนแรง อาจเสียชีวิตได้



ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามคำแนะนำ

โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

- โรคคอตีบทำให้หายใจลำบาก หากรุนแรง อาจเสียชีวิตได้
- โรคบาดทะยักทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หายใจลำบาก อาจเสียชีวิตได้
- โรคไอกรน ทำให้ไอต่อเนื่องรุนแรง



ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ทุก 10 ปี

โรคงูสวัด

- เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท
- อาจปวดแสบร้อนตามผิวหนัง
- หากเป็นรุนแรง อาจมีอาการที่ตา หรืออาการทางสมอง



ฉีดวัคซีน 1 หรือ 2 เข็ม ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีน



13 เมษายน วันผู้สูงอายุ