



ความรู้เกี่ยวกับพิษจาก สารไซยาไนด์ ที่ควรทราบ

“ไซยาไนด์” เป็นสารพิษที่มีความรุนแรงมากและออกฤทธิ์ได้เร็ว

อาการพิษเริ่มจากอาการทางสมอง คือ



หมดสติเฉียบพลันโดยอาจมี
อาการชักนำมาก่อนหรือไม่ก็ได้



ความดันเลือดต่ำ
และชีพจรเต้นเร็ว



อาจพบว่าผิวหนัง
และเยื่อเมือมีสีแดงกว่าปกติ

ตามด้วย



หากมีประวัติดื่มเครื่องดื่มหรือกินอาหาร
แล้วเกิดอาการข้างต้นในเวลาไม่กี่นาที

ควรนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยแยกโรคว่าเป็นโรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดในสมอง หรือพิษจากไซยาไนด์

การรักษา

มียาต้านพิษจำเพาะ หากได้รับยาต้านพิษทันเวลา จะสามารถรอดชีวิตได้



หากได้รับพิษจาก สารไซยาไนด์ ติดต่อรับยาต้านพิษอย่างไร

ประเทศไทยมีโครงการยาต้านพิษ ที่จัดให้มีการสำรองยาต้านพิษหลายชนิด
ไว้ในโรงพยาบาลระดับจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
**ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถใช้ยาต้านพิษชนิดนี้ได้
โดยแพทย์สามารถติดต่อขอยาต้านพิษจากแหล่งสำรองยาได้ตลอดเวลา**

ในกรณีของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ของรัฐบาล และศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี มีการสำรองยาต้านพิษจากสารไซยาไนด์
เมื่อมีผู้ป่วยได้รับพิษหรือสงสัยว่าเกิดพิษจากสารไซยาไนด์
สามารถปรึกษาศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีผ่าน "สายด่วน 1367" หากมีข้อบ่งชี้ในการรักษา
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมีระบบประสานรถพยาบาลพร้อมนำส่งยาต้านพิษอย่างเร่งด่วน

สำหรับจังหวัดอื่น ๆ เมื่อมีผู้ป่วยได้รับสารไซยาไนด์มาที่โรงพยาบาล
สามารถดำเนินการร้องขอยาต้านพิษได้ดังนี้

- 1 ขอยาต้านพิษจากแหล่งสำรองยาที่ใกล้ที่สุด
- 2 ติดต่อศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเพื่อ

 ร่วมวินิจฉัย ประเมินความรุนแรง
และความเร่งด่วนในการให้ยาต้านพิษ

 ช่วยหาแหล่งสำรองยาต้านพิษ

 ประสานงานระหว่างโรงพยาบาล
ที่มีผู้ป่วยกับแหล่งสำรองยาต้านพิษ

เมื่อผู้ป่วยได้รับพิษ
และต้องได้รับยาต้านพิษ

"สายด่วน 1367"