



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กระเพาะทะลุ

เกิดจากผนังกระเพาะอาหารมีรูรั่วทำให้กรด
หรือน้ำย่อยไหลเข้าช่องท้อง ทำให้ปวดท้องอย่างรุนแรง
และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในกระแสเลือดและอาจทำให้เสียชีวิตได้



ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุ

- ✓ ความเครียด
- ✓ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่
- ✓ ใชยาเสพติด เช่น โคเคน หรือแอมเฟตามีน
- ✓ ติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคทีเรีย
- ✓ ใชยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดและต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน) ยาสเตียรอยด์ และยาเคมีบำบัดบางชนิด
- ✓ เจ็บป่วยด้วยโรคทำให้มีการหลังกรดในกระเพาะอาหารผิดปกติ เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร
- ✓ ผ่าตัดกระเพาะอาหาร
- ✓ อุบัติเหตุทางร่างกาย เช่น มีดหรือกระสุนทะลุกระเพาะอาหาร การกลืนวัตถุลงกระเพาะอาหาร เช่น ขงเล่น เครื่องเขียน เป็นต้น
- ✓ การส่องตรวจกระเพาะอาหารด้วยกล้อง แม้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

อาการ



ปวดท้องรุนแรง



ท้องบวมแข็งผิดปกติ



ไข้สูง




อ่อนเพลีย




หายใจเหนื่อย หอบ

วิธีรักษา



รักษาแผลตามสาเหตุ



ผ่าตัดเพื่อปิดรอยรั่ว
และล้างช่องท้อง

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>