



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รู้ก่อนใช้ 

‘ยาเหน็บริดสีดวง’

ยาเหน็บริดสีดวง คือ ยาชนิดแท่งสำหรับผู้ป่วยที่เป็นริดสีดวงทวาร มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ช่วยลดอาการอักเสบ ปวด บวม แดง



ผลข้างเคียง

• อาการที่พบบ่อย



ผิวหนัง แดง
คัน เจ็บ




แสบร้อนบริเวณ
ทวารหนัก

• กรณีที่ใช้ยานานอาจทำให้



ประจำเดือนมาไม่ปกติ



ผิวหนังบางเป็นแผลได้ง่ายขึ้น



ตาพร่ามัว



สิวขึ้น

ข้อควรระวัง

1 ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน 5-7 วัน




2 เก็บยาไว้ในช่องเย็นเพื่อไม่ให้ยาละลาย



3 ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเหน็บยา



4 ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัส



5 ผู้ที่มีโรคประจำตัว
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง



LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

พศ. นพ.พงศ์ศิษฎ์ สิงห์ทัศน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>