



งูสวัด

อันตราย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใส (Varicella Zoster Virus, VZV) โดยเมื่อหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อจะไปซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทของร่างกายโดยไม่มีอาการ แต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำลง เชื้อก็อาจกำเริบก่อให้เกิดเป็นโรคงูสวัดได้

อาการ



มีผื่นแดงตุ่มน้ำใส
ขึ้นตามแนวเส้นประสาทของ
ร่างกาย ข้างใดข้างหนึ่ง



ปวด แสบร้อน
ตามแนวเส้นประสาท
บริเวณตุ่มน้ำใส

วิธีป้องกัน

- ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถฉีดวัคซีนงูสวัด (Recombinant zoster vaccine, RZV) เข็มแรกแล้ว เนื้อ จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 2-6 เดือน
- ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ห่างกัน 1-2 เดือน

รู้หรือไม่ว่า?

อาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย คือ อาการปวดปลายประสาทหลังเป็นโรคงูสวัด แม้ว่าผื่นจะหายไปแล้ว โดยอาจปวดนานเป็นสัปดาห์จนถึงหลายเดือน ในบางรายโรคงูสวัดอาจขึ้นตาและเกิดกระจกตาอักเสบได้

