



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยาลดไขมันในเลือด รู้ไว้ใช้ยา อย่างมีประสิทธิภาพ

ยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน (Statins) เช่น Simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pitavastatin

กลไกการออกฤทธิ์

ยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลของร่างกาย ทำให้ปริมาณไขมันไม่ดี (LDL) ลดลง จึงช่วยรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

ออกฤทธิ์สูงสุดในระยะเวลา 7-10 วันหลังกินยา

สามารถลดไขมัน
LDL ได้ **30-50%**

ขึ้นกับชนิดและขนาดยาที่ได้รับ



ข้อควรระวัง

- ❌ ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
- ❌ ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ และโรคพิษสุราเรื้อรัง การใช้ยาต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้น
- ❌ ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตร
- ❌ ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

รู้หรือไม่ว่า?

ยากลุ่มนี้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยได้รับร่วม ดังนั้น ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร เพื่อตรวจสอบรายการยาทั้งหมดที่ใช้ร่วมกับยากลุ่มสแตติน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยา และป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา

ผลข้างเคียง

มีอาการ
ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ



Tips

หากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล



LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

รับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่
Rama Channel

ภก.วิษณุภัทร ธรรานนท์
เภสัชกรคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>