



เจ็บคอแบบไหน ? เสี่ยง! “ก่อนชิลอักเสบ”



ก่อนชิลอักเสบ (tonsillitis) มักเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ บวม แดง และอาจมีหนองบริเวณต่อมก่อนชิล

อาการ



ต่อมก่อนชิลบวม แดง
อาจมีจุดขาว ๆ เหลือง ๆ คล้ายหนองกระจายกัน



เจ็บคอ กลืนลำบาก



มีไข้ หนาวสั่น



คลำได้ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ กัดเจ็บ



ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว



การรักษา

ปรับพฤติกรรม



เจ็บคอเล็กน้อย ไม่มีไข้ ดังนั้นควรพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำมาก ๆ

ยาปฏิชีวนะ



หากมีการติดเชื้อไข้ร่วมกับอาการเจ็บคอ แพทย์จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ

ผ่าตัดต่อมก่อนชิล



กรณีต่อมก่อนชิลอักเสบเป็นช้า หลายครั้งหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจมีความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งต่อมก่อนชิล

รู้หรือไม่?

“มะเร็งต่อมก่อนชิล” อาจสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัส HPV หรือปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ



รับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่
[Rama Channel](#)

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

อ. พญ.โภเชดา หนันแก้ว
ภาควิชาโลหิต ศศ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>