



อย่าวางใจ โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีอาการดังนี้



มีไข้สูง
ปวดเมื่อยตัว
ปวดศีรษะ




มีจุดเลือดออก
อาเจียน
ถ่ายเป็นสีดำ



ตบโต
มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครง
ข้างขวา



ระบบ
ไหลเวียนเลือด
ผิดปกติ
มีภาวะช็อก



อาจพบ
อาการแทรกซ้อน
เช่น ไตวาย
สมองอักเสบ



การรักษาพยาบาล



- ให้น้ำพาราเซตามอล*
ห้ามใช้แอสไพริน และยากกลุ่มไอบูโพรเฟน



- ดื่มน้ำมากๆ



- พบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังนี้
อาเจียนมาก ปวดท้องมาก มีเลือดออก
ไหลสด ตัวเย็นผิดปกติ ซึมลง ไม่ค่อยรู้สึกตัว



- เช็ดตัวเพื่อลดไข้



การป้องกัน



- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



- สวมเสื้อผ้ามิดชิด
- ใช้ยากากันยุง
- นอนในที่ปิดมิดชิด

ฉบับเพิ่มเติมข้อมูล

19 ก.ค. 2562

*ไม่ควรใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาด

LINE Ramathibodi

ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

<https://med.mahidol.ac.th/infographics>