

กินร้อน



ช้อนกลาง



ล้างมือ




ห่างไกล

"โนโรไวรัส"

Norovirus


กลุ่มเสี่ยง

เด็กเล็กถึงเด็กโต



มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่

อยู่กันเป็นกลุ่มหรือเล่นด้วยกัน



อาการ

คลื่นไส้



อาเจียนรุนแรง



ถ่ายเหลว

มีไข้ ปวดหัว



ปวดเมื่อยตัว



ปวดท้อง



สัญญาณนำไปสู่ภาวะช็อก



- ซึม
- ถ่ายท้องรุนแรง
- ปัสสาวะน้อยหรือมีสีเข้ม



พบแพทย์ทันที

"ยาฆ่าเชื้อ"

"ยาปฏิชีวนะ"

"แอลกอฮอล์"

ไม่สามารถป้องกันได้

<http://med.mahidol.ac.th/infographics>

LINE
@ramathibodi

อ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล